



กรมปศุสัตว์

เราจะทำหน้าที่ตามกฎหมาย




เจ้าของมีหน้าที่ ต้องพาสุนัข-แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนครั้งแรกตั้งแต่อายุ 2 - 4 เดือน กระตุ้นเข็มที่สอง 3 - 4 สัปดาห์
หลังจากเข็มแรกและฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกปีหรือตามที่สัตวแพทย์กำหนด



เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (เหรียญ)
(สีของเหรียญเปลี่ยนทุกปี)



ใบรับรองการฉีดวัคซีน

หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

ไม่นำสุนัข-แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
มีโทษปรับ 200 บาท

ไม่ห้อยเหรียญให้กับสุนัข-แมว
มีโทษปรับ 200 บาท

ในกรณีเหรียญหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน
สูญหายหากไม่ติดต่อขอรับแทนของเดิม
มีโทษปรับ 200 บาท

ใช้เหรียญหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนปลอม
โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

จัดทำโดย

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คาถา 5 ย กันสุนัขกัด


ย 1

อย่าเหยย
สุนัขให้โมโห



ย 2

อย่าเหยียบหาง, หัว, ตัว, ขา,
หรือทำให้สุนัขตกใจ



ย 3

อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัด
ด้วยมือเปล่า



ย 4

อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้าย
อาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร



ย 5

อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัข



เมื่อถูกสุนัข หรือแมว กัด ข่วน ต้องทำดังนี้

1



ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้งให้ถึงก้นแผล
ล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้งใส่ยารักษาแผลสด

2



จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ/กักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน
สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


3



ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง

ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด

โรคพิษสุนัขบ้า




เลี้ยงสุนัข รักกฎวิถี

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์
 ป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก
 กระแต โดยเฉพาะพบมากที่สุดในสุนัข และรองลงมาคือแมว

สาเหตุการติดต่อ



คนและสัตว์รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อกัด
 หรือข่วน โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมวจะพบว่า
 มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลายตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน

: อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์
 ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ
 ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

• ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

• ระยะตื่นเต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวายตื่นเต้นหงุดหงิด
 ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง

• ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการค้างห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปากน้ำลาย
 ไหล ขย้อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ยทรงตัวไม่ได้
 ล้มลงอัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

: อาการที่พบในคน


ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ 3 สัปดาห์ – 6 เดือน แต่บางราย
 มีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการ
 เริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรง
 บริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม
 ไม่ชอบเสียงดัง เพื่อเจ้า กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ
 ปวดท้องน้อยและขากล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
 หรืออาจชัก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด

คำแนะนำ

สำหรับคนเลี้ยงสุนัข


1

นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
 (ปีแรกควรรีด 2 ครั้ง)



2

ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพาน
 ในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัข
 ออกนอกบ้านต้องอยู่ในสายจูง



3

ไม่นำสุนัขไปปล่อย และ
 ต้องคุมกำเนิด
 ไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป



หยุดปล่อยหมา


ป้องกันสุนัขบ้าได้อย่างไร



สุนัขบ้าได้

1. ไม่ปล่อยสุนัขพเนจร

สุนัขจรจัดที่อยู่ข้างถนนเป็นตัวแพร่เชื้อโรคที่สำคัญ อาจกัดคนที่เดินผ่านไปมาหรือกัดสุนัขอื่นทำให้เป็น



สุนัขบ้าได้ อายุระหว่าง 2-4 เดือน ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดซ้ำตามที่สัตวแพทย์

2. ฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีสุนัข

จรเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ (ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 2535) ที่จะต้องนำ




สุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี

3. อย่าให้มีลูกมากโดยการทำ

หมันสุนัขทั้งตัวผู้และตัวเมีย หรือฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขตัวเมีย ไม่ให้มีลูกมากเกินไปจน

ไม่อาจเลี้ยงดูได้ต้องนำไป

ปล่อยกลายเป็นสุนัขจรจัดและเป็นปัญหาของสังคม



เรื่อนน่ารู้....



สุนัขตัวผู้เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าตัวเมีย



สุนัขแสดงอาการบ้าแบบดุร้ายมากกว่าแบบซึม



กว่า 90 % ของผู้ที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากการไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีน หลังจากถูกสัตว์กัด



ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ เนื่องมาจากการถูกกัดโดยสุนัขจรจัด หรือสุนัขที่มีเจ้าของแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



สุนัขอายุน้อยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าอายุมาก



ผู้ชายตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าผู้หญิง



การช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยการหาอาหาร แต่ไม่นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดไม่ให้มีลูก เป็นการเพิ่มจำนวนสุนัขจรจัดและแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบ้า



ลูกสุนัข (ทุกอายุ) มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกับสุนัขโต



ด้วยความห่วงใย และปรารถนาดี

ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ตำบลกำแพง

สำนักปลัด เทศบาลตำบลกำแพง

โทร. 077-810628

ควรรีบนำสุนัขหรือสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไปพบสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที


โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อไวรัส รูปร่างคล้ายกระสุนปืน ทำลายได้ง่าย เมื่อถูกความร้อน ความแห้ง แสงแดด ยาฆ่าเชื้อพวก ลอรีน แอลกอฮอล์ กรด หรือ ด่าง อย่างแรง เกิดในสัตว์เลือดอุ่น สัตว์ลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู งู ค่าง รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมากที่สุดที่สุนัข (96% ของจำนวนที่พบเชื้อจากการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ) รองลงมา คือ แมว

การติดต่อ โดยถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนัง ที่มีบาดแผล

ระยะฟักตัวในสุนัข 7 วัน ถึง 6 เดือน ขึ้นกับบริเวณที่ได้รับเชื้อ ความรุนแรงของเชื้อ โดยเฉลี่ยประมาณ 2-6 สัปดาห์

อาการในสุนัข มี 2 ชนิด คือ ชนิดซึม และ ชนิดดุร้าย



จะทำอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัด



1. ล้างแผล

ล้างแผลด้วยสบู่กับน้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อล้างเชื้อออกจากบาดแผลถ้ามี

เลือดออกควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเค้นแผล เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปส่วนอื่น



2. ใส่ยา

ใส่ยาใส่แผล เช่น เบตาดีน ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ 70 %


จะช่วยฆ่าเชื้อโรค อย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกลือ ยาฉุน ลงในแผล ไม่ควรเย็บแผล ถ้าจำเป็นควรรอไว้ 3-4 วัน ถ้าเลือดออกมากหรือแผลใหญ่อาจเย็บหลวม ๆ และใส่ท่อระบายไว้



3. กักหมา

กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่างน้อย 15 วัน โดยให้น้ำและอาหารตามปกติ

อย่าฆ่าสัตว์ให้ตายทันที เว้นแต่สัตว์นั้นดุร้ายกัดคนหรือสัตว์อื่นหรือไม่สามารถกักสัตว์ไว้ได้ ถ้าสัตว์นั้นหายไปให้ถือว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า



4. หาหมอ

รีบไปหาแพทย์หรือสัตว์แพทย์ทันทีที่ถูกกัด เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและซีรัมยารักษา

ที่กัดตาย เมื่อสัตว์ตายรีบตัดหัวส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า

จะส่งซากสัตว์วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร

เมื่อสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักขังสัตว์ไว้ในที่ปลอดภัย และเฝ้าดูอาการประมาณ 15 วัน ไม่ควรทำลายสัตว์โดยไม่จำเป็น ควรปล่อยให้สัตว์ตายเอง ซึ่งจะตรวจพบเชื้อได้ง่าย และแน่นอน ในการส่งซากควรส่งให้เร็วที่สุดโดยปฏิบัติตามวิธีอย่างระมัดระวัง เรื่องความสะอาดและระลึกไว้เสมอว่า สัตว์อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ จึงควรสวมถุงมือขณะเก็บซาก และล้างมือให้สะอาดหลังจากเก็บซาก ควรส่งเฉพาะส่วนหัว



1. ตัดหัวสัตว์

ตัดหัวสัตว์ตรงคอต่อ ใส่ถุงพลาสติกซ้อนหลาย ๆ ชั้น รัดปากถุงให้แน่น ใส่ถุงมือทุกครั้งที่ตัดหัวสัตว์ ถ้าเป็นแมวหรือสัตว์ตัวเล็กสามารถส่งได้ทั้งตัว



2. แช่แข็ง

ใส่กระติกหรือภาชนะอย่างอื่น เช่น กล่องโฟม แล้วใส่น้ำแข็งให้เย็นตลอดเวลา แล้วใส่น้ำแข็งให้เย็นตลอดเวลา



3. ประเวศ

ส่งพร้อมประวัติสัตว์ ชนิด เพศ อายุ สี อาการป่วย ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เจ้าของสัตว์ และผู้ถูกกัด

ในกรณีส่งซากควรส่งให้เร็วที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ

สัตว์แพทย์ กรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสัตว์ เช่น ชนิดสัตว์ สี เพศ พันธุ์ อายุ สถานที่ถูกกัด เพื่อวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคทั่วไป